

Doğu meyve güvesi (Grapholitha Cydia molesta)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.06.2018 Брой: 6/2018



Temmuz ayında, zararlının ikinci nesil kelebekleri uçar ve yumurta bırakır. Üçüncü nesil tırtıllar esas olarak meyvelere zarar verir. Tırtıl, meyvelerin birbirine temas ettiği noktalardan veya sapın yakınından yanlamasına girer. Sıklıkla zamk akıntısı (gumosis) gözlemlenir. Zarar gören meyveler şekil bozukluğuna uğrar veya çürür. Erken olgunlaşma belirtileri gösterir ve dökülürler.

Şeftali güvesi tırtılları, çok sayıda parazitoit tarafından saldırıya uğrar. En büyük öneme sahip olanı, brakonid *Ascogaster quadridentatus* Wesm.'dir.

Zararlı ile mücadele stratejisi:

Şeftali güvesinin yayılımını sınırlamak için, zamanında tespit edilmesi amacıyla bahçelerde yıllık kontroller yapılarak sıkı bir karantina kontrolü gereklidir. Şeftali güvesinin uçuşunun başlangıcı ve dinamikleri, feromon tuzakları ile belirlenir.

Kimyasal mücadele, **ETK (Ekonomik Zarar Eşiği)** düzeyinde gerçekleştirilir:

-vejetasyon dönemi boyunca – haftada tuzak başına 10-15 kelebek;

-genç bahçeler – tırtıl tarafından %2-3 bulaşık sürgün;

-meyve veren bahçeler - %5 zarar görmüş sürgün veya tırtıl tarafından %2-4 bulaşık meyve.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri:

avant 150 EC - 33.3 ml/da; vaztak nov 100 EC – 0.0125%; deca EC / desha EC/dena EC - 50 – 70 ml/da; decis 2.5 EC – 0.04%; dimilin 25 WP - 0.04%; dursban 4 EC - 150-200 ml/da; eforia 045 ZC - 150 ml/da; karate express WG /ninja /forza - 100-120 g/da; coragen 20 SC - 16 – 30 ml/da; luzindo 40 WG - 0.025 kg/da; madex twin - 10 ml/da; meteor - 90 ml/100 l su; runner 240 SC – 0.03%; rapax SBS europa - 100-200 ml/da; sumi alpha 5 EC/sumicidin 5 EC – 0.02%.