

Temmuz başında, agrometeorolojik koşullar olumlu bir değişim geçirecek

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2018 Брой: 7/2018



Haziran ayının son günlerinde Güney Bulgaristan'da (Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Karnobat) birçok yerde 50-60 l/m²'yi aşan yağın ve önemli yağışlar, 0-50 cm ve 0-100 cm katmanlarındaki toprak nem rezervlerinde bir artışa yol açtı. Tarla bölgelerinin çoğunda bu rezervler tarla kapasitesinin (FC) %80-85'inin üzerine çıktı. Bazı güney bölgelerinde yoğun yağışlar tarım arazilerini su altında bıraktı ve hasara – olgun buğday ürünlerinin yatmasına – neden oldu.

Önümüzdeki dönemde sıcaklıklarda bir artış ve ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu için koşullarda bir iyileşme öngörülmektedir. Bu dönemde mısırdaki, erkenciliğine bağlı olarak farklı gelişim aşamaları gözlenecek – yaprak oluşumu, püskül çıkarma, püskül çiçeklenmesi ve koçan püskülü oluşumu. Ayçiçeğinde, daha yüksek tarlalarda

çiçeklenme başları oluşacak, tarla bölgelerindeki ekimlerde ise çiçeklenme aşaması gerçekleşecek. Fasulye ve soya fasulyesinde bakla oluşumu gözlenecek, pamukta ise tomurcuklanma aşaması görülecek.

Dönemin ikinci yarısında tarla bölgelerinde yağış beklenmemektedir, bu da acil bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için bir fırsat sağlayacaktır. Haziran sonundaki yağışlı hava, bir dizi fungal hastalığın gelişimi için koşullar yarattı: domateslerde mildiyö; salatalıklarda külleme; meyve ağaçlarında kabuklanma ve geç kahverengi çürüklük, bu da sistemik fungusitlerin kullanılmasını gerektirecektir.

Temmuz ayının ilk on günlük döneminin ortasına kadar, ülkenin birçok bölgesinde üst toprak katmanlarındaki yüksek nem içeriği, olgun tahıl ürününün hasadını zorlaştıracaktır.

Kaynak: NIMH