

# Temmuz ayının ikinci on günlük döneminde, iklim koşullarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.07.2018 Брой: 7/2018



Temmuz ayının ikinci on günlük döneminin ilk yarısında, tarımsal meteorolojik koşullarda kısa süreli, olumlu bir değişiklik bekleniyor. Temmuz ayının ilk on gününde ülkenin birçok yerinde sık ve yoğun yağışlar, tarla çalışmalarının seyrini aksattı ve buğday hasadını engelledi. Kuzeybatı ve Orta Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde (Vratsa – 85 l/m<sup>2</sup>, Montana – 84 l/m<sup>2</sup>, Lom – 118 l/m<sup>2</sup>, Kneja – 81 l/m<sup>2</sup>, Pleven – 77 l/m<sup>2</sup>, Lovech – 88 l/m<sup>2</sup>, Veliko Tarnovo – 120 l/m<sup>2</sup>), Sofya ovasında (Sofya – 118 l/m<sup>2</sup>) ve güney bölgelerde (Kırcaali, Karnobat) yağış miktarı aylık normu aştı. Bazı tarlalarda buğday ekimlerinde yatma, su baskını ve başaklarda tane filizlenmesi kaydedildi.

Dönemin ikinci yarısında öngörülen yağışlar, buğday hasadını ek olarak geciktirecek ve bu da henüz hasat edilmemiş tahıl ürününün kalitesinin bozulmasına yol açacak.

İkinci on günlük dönemin sonuna kadar, yazlık ürünlerin gelişimi iklim normlarına yakın sıcaklıklarda ilerleyecek. Dönem içinde ayçiçeğinde çiçeklenme, dölllenme ve tane dolumu gerçekleşecek. Mısırdaki ise erkencilik durumuna bağlı olarak farklı gelişim evreleri gözlemlenecek – geç hibritlerde tepe püskülü çıkarmadan, Tuna Ovası'ndaki (Bazovets tarımsal meteoroloji istasyonu) ve güney bölgelerdeki (Filibe tarımsal meteoroloji istasyonu) erkenci mısır hibritlerinde süt olumuna kadar. Soya fasulyesinde kitlesel bakla oluşumu (Pavlikeni tarımsal meteoroloji istasyonu), pamukta ise çiçeklenme evresi görülecek.

Geçmiş dönemdeki nemli hava ve meydana gelen dolu fırtınaları, bir dizi fungal hastalığın yayılma ve gelişme riskini artırdı: domateslerde mildiyö ve Alternarya; erkenci sofralık üzüm çeşitlerinde kurşuni küf, asma sürgünlerinde mildiyö, meyve ağaçlarında geç yanıklık ve kabuklu leke.

Bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için uygun koşullar dönemin başında mevcut olacak. Ürünlerin olgunlaşma süresiyle uyumlu, uygun bir hasat öncesi bekleme süresine sahip sistemik etkili fungusitlerin kullanılması önerilir.

*Kaynak: NIMH*