

Tarım ürünlerinin bitki sağlığı durumu 01/09/2014 itibarıyla Buğday ve Arpa

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 16.10.2014 Брой: 10/2014



Ağustos ayının ilk günlerinde, Batı Bulgaristan'daki tarımsal meteorolojik koşullar istikrarsız kalmaya devam etti. Bu durum buğday hasadını daha da zorlaştırdı ve tahıl kalitesini kötüleştirdi. Ay sonuna kadar, Köstendil, Pernik ve Sofya illerinin yüksek kesimlerinde buğday hasadı hala tamamlanmamıştı. Ağustos ortasında, atmosfer stabil hale geldi, sıcaklıklar arttı ve ülkenin farklı bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 33-38°C arasına ulaştı.

Ağustos ayının ikinci yarısında, bazı yazlık ürünler gelişimlerini tamamladı. Ayçiçeği hasadı ve kanola ekimi başladı. Güney Bulgaristan'da, mevsim boyunca daha az yağış alan bölgelerde, erken hibrit mısır hasadı da başladı.

BUĞDAY VE ARPA

İstikrarsız tarımsal meteorolojik koşullar tahıl kalitesini kötüleştirdi ve geç hasat edilen ürünlerde *Alternaria* cinsinden fungal patojenlerin görülmesi kaydedildi (Vidin, Vratsa, Pernik, Sofya-ili, Stara Zagora, Targovişte vb.). Yaz aylarındaki yağışlar, tahıl ürünleri ve kanola hasadından sonra temizlenen alanlarda ikincil yabancı ot istilasını tetikledi. Blagoevgrad, Vratsa, Lom, Razgrad ve Ruse illerinde, anız tarlalarının toplam herbisitlerle ilaçlanması kampanyası devam etmekte olup, tahıl ile yeniden ekim yapılması planlanan alanlara öncelik verilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 114 bin dekar alan ilaçlanmıştır. Ağustos ayında anız tarlalarında, tarla kenarlarında ve yol kenarı şeritlerinde yapılan araştırmalarda, tarla faresinin gelişiminde bir gradasyon eğilimi gözlemlendi.

Yoğun yabancı ot istilası ve taze bitki örtüsünün varlığı nedeniyle, zararlının kaydedilen popülasyon yoğunluğu Ekonomik Eşiğin (EE sonbahar: 2 aktif koloni/dekar) civarında ve üzerindedir. Kışlık ürünler ve kanola anız tarlalarında, Pleven, Razgrad, Ruse ve Stara Zagora illerinde kaydedilen fare yoğunluğu, tekil yuvalardan 2 aktif koloni/dekara kadar değişmektedir. Burgas, Varna, Vratsa, Dobriç, Köstendil ve Loveç illerinde ise 3 aktif koloni/dekara kadar kayıt yapıldı. Pernik ve Targovişte illerinde kaydedilen yoğunluk 2-7 aktif koloni/dekardır. Şumnu ilinde ise 2-18 aktif koloni/dekar yoğunluğu kaydedilmiştir. 2014 sonbaharında uygun iklim koşulları devam ederse, Kuzey Bulgaristan ve ülkenin batı kesimindeki tarlalarda farelerde kitlesel bir çoğalma beklenmektedir. Güney Bulgaristan'da, Filibe, Stara Zagora, Yambol ve Burgas illeri bölgelerinde de tarla faresi ve Doğu Akdeniz ev faresinin sayılarında bir artış beklenmektedir. Kemirgen farelerin gelişim dinamiklerini izlemek için araştırmalar devam etmektedir. Kemirgen farelerin gelişimindeki eğilim şu şekildedir: sayılarında artış, zararlı faaliyet ve yayılış alanlarının genişlemesi.