

Eylül 2018 için Agrometeorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2018 Брой: 9/2018



Eylül ayı başında agrometeorolojik koşullar, kuru, ılık ve ova bölgelerindeki bazı yerlerde sıcak hava ile belirlenecek. İlk on günlük dönemin ortasına kadar, ayçiçeği hasadını tamamlamak, erkenci mısır hibritlerini toplamak, derin sürüm, ekim öncesi toprak işleme ve kışlık kanola ekimi için koşullar uygun olacak.

Ay başında normalin üzerinde beklenen termal koşullar, geç tarla bitkilerinin gelişiminin son aşamalarının ilerlemesini hızlandıracak. Orta-geçici mısır hibritlerinde balmumu ve tam olgunluk aşamaları gözlemlenirken, geçici hibritlerde ise süt olumu ve süt olumundan balmumu olumuna geçiş görülecek. Pirinçte süt olumu aşaması, pamukta ise koza açılması hakim olacak.

İlk on günlük dönemin ikinci yarısında ve ikinci on günlük dönemin çoğu gününde, agrometeorolojik koşullar oldukça dinamik olacak. Yağış, sıcaklıklarda düşüş ve çürüklüğe neden olan patojenlerin gelişme riskinde artış öngörülüyor – sonbahar-kış meyve çeşitlerinin meyvelerinde geç kahverengi çürüklük (*Monilia fructigena*) ve geçici şaraplık üzüm çeşitlerinde gri küf (*Botrytis cinerea*). Bu yıl, yağışlı geçen yaz, bağlarda bitki koruma ilaçlamalarının zamanında uygulanmasını engelledi. Bazı yerlerde, salkım güvesi ve küllemenin neden olduğu kitlesel enfeksiyonlar üzüm verimini olumsuz etkiledi.

Eylül ayının ikinci on günlük döneminde, geçici mısır hibritleri de balmumu ve tam olgunluk aşamalarına girecek. Bu dönemde, pirinç ekimlerinde yaygın olarak olgunlaşma aşaması gözlemlenecek.

İkinci on günlük dönemin sonunda, yüksek tarlalarda don oluşma olasılığının artması ve üçüncü on günlük dönemde – ayrıca ova bölgelerinin bazılarında da don riski öngörülüyor; bu da dona hassas sebze ürünlerinin zamanında hasat edilmesini gerektiriyor.

Eylül ayında beklenen, aylık norm civarında ve üzerindeki yağışlar, kışlık kanolanın vejetasyonunun ilk aşamalarının normal ilerlemesi için nem sağlayacak. Ay sonunda, optimal zaman penceresi içinde (Eylül'ün ilk yarısında) ekilen kanolada çıkış aşaması gözlemlenecek. Çıkış aşamasında, kanolaya lahana gövdeli pire böceği (ergin bireyler) ve kanola testereli arısı larvaları (yalancı tırtıllar) ciddi zarar verir.

Üçüncü on günlük dönemin ikinci kısmında önemli bir yağış öngörülüyor. Ayın son günlerinde, kışlık tahıl ürünleri ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işleme yapılması için koşulların iyileşmesi bekleniyor. Eylül sonunda, yüksek tarlalarda arpa ve buğday ekimi için agroteknik dönemler başlar.

Kaynak: NIMH