

Eylül ayında meyve bahçesinde – kimyasal uygulamalar azalır

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 18.09.2018 Брой: 9/2018



Eylül ayında sıcaklıklar düşer ve genellikle maksimum değerler 25°C'yi geçmez. Ağaçların yaprakları fotosentez yapmaya aktif bir şekilde devam eder ve meyvelerin (sonbahar ve kış çeşitleri için) beslenmesini, meyve tomurcuklarının farklılaşmasını ve yedek besin maddelerinin depolanmasını sağlar. Bu ay boyunca, çoğu meyve türü için ilaçlama yapmak gerekli değildir, ancak daha az olsa da yine de bazı uygulamalara ihtiyaç duyulur.

Elma bahçelerinde, geç yanıklık enfeksiyonlarına ve depolama sırasında meyve çürüklüğüne neden olan *Monilinia*, *Penicillium*, *Botritis*, *Alternaria*, *Botryosphaeria*, vb. cinslerine ait mantarlara karşı ilaçlama yapılır. Elma içkurdu zararı da devam eder.

Meyveleri Eylül ayının ikinci yarısında hasat edilecek olan elma çeşitleri, hasat öncesi bekleme süresi kısa olan insektisitlerle ilaçlanmalıdır.

Geç olgunlaşan **armut çeşitleri** için meyve güvelerine (elma içkurdu, doğu meyve güvesi ve armut güvesi) ve meyve çürüklüğü etmenlerine karşı mücadeleye devam edilmelidir. Elma için belirtilen insektisitler ve fungisitler kullanılır.

Ülkemizde yetiştirilen **ayva** çeşitlerinin meyveleri, geç kahverengi çürüklük, gri küf ve yumuşak çürüklüğe karşı oldukça hassastır; bu hastalıklar özellikle meyve olgunlaşması sırasında ve daha sonra depolama döneminde sık yağışların olduğu dönemlerde oldukça zararlıdır. Bu durum, bu patojenlere karşı ilaçlama yapılmasını gerektirir. Meyvelerin elma içkurdu ve doğu meyve güvesi istilasından korunması için fungisit solüsyonuna bir insektisit de eklenir.

Bu dönemde ilaçlama için gerekli bitki koruma ürünleri hakkında bilgi, "Bitki Koruma" dergisinin 8/9 2018 sayısında bulunabilir.