

Tarım Ürünlerinin Fitosaniter Durumu 09.01 Tarihi İtibarıyla Mısır

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 17.10.2014 Брой: 10/2014



Ağustos ayının ilk günlerinde, Batı Bulgaristan'daki tarımsal meteorolojik koşullar istikrarsız kalmaya devam etti. Bu durum buğday hasadını daha da geciktirdi ve tane kalitesini kötüleştirdi. Ayın sonuna kadar, Köstendil, Pernik ve Sofya illerinin yüksek kesimlerinde buğday hasadı hala tamamlanmamıştı. Ağustos ortasında atmosfer şartları stabilize oldu, sıcaklıklar arttı ve ülkenin farklı bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 33-38°C arasına ulaştı.

Ağustos ayının ikinci yarısında, bazı yazlık ürünler gelişimlerini tamamladı. Ayçiçeği hasadı ve kanola ekimi başladı. Güney Bulgaristan'da, mevsim boyunca daha az yağış alan bölgelerde, erkenci hibrit mısır hasadı da başladı.

MISIR

Fenofaz: "erken balmumu olumu" – "tam olum"

Mısır Kurdu

Şu anda, zararlının ikinci neslinin neden olduğu zararlı faaliyet gözlemlenmektedir. Vidin, Montana, Pleven, Filibe vb. illerde kaydedilen yoğunluk Ekonomik Zarar Eşiği'nin (EZE) altında olup, en fazla %25 bulaşık bitkiye ulaşmıştır (EZE: tane mısırı – bitki başına 3-4 zararlı larva tarafından %90 bulaşık bitki). Son yıllarda Bulgaristan'da kullanılan mısır hibritleri, verimi etkilemeksizin zararlının larvalarının neden olduğu önemli hasarlara dayanabilme kapasitesine sahiptir. Tespit edilen düşük yoğunluk göz önüne alındığında, kimyasal mücadele ekonomik olarak haklı görülmemektedir. Bununla birlikte, bu yılın yaz aylarında larva gelişimi için uygun olan, 34°C'nin altındaki sıcaklıklar ve %70-100 nem oranı gibi optimal koşullar çiftçileri endişelendirdi ve mısır kurdu ikinci nesline karşı insektisit uygulamaları 163,6 bin dekar alanda gerçekleştirildi.

Pamuk Kapsül Kurdu

Zararlının ikinci nesline ait üçüncü ile beşinci dönem larvalarının neden olduğu hasar, Vidin, Vraça, Filibe ve Targovişte bölgelerindeki mısır koçanlarında doğrulandı. %5 ila %15 oranında hasarlı koçan enfestasyonu kaydedildi. Vidin, Montana, Pleven ve Filibe illerinde 163,6 bin dekar alanda ilaçlama yapıldı. Gerçekleştirilen püskürtme uygulamaları, yaprak bitleri ve mısır kurduna karşı eş zamanlı mücadele için kombine edildi.