

Armut tomurcuk hortumlu böceği sadece armuta değil ciddi zararlar verir.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.10.2018 Брой: 10/2018



Armut tomurcuk hortumlu böceği (*Anthonomus pyri* Kollar) ülke genelinde yaygındır ve sadece armutta değil, elma, kayısı ve erikte de ciddi zararlara neden olur.

Zararlı, yılda bir nesil geliştiren küçük bir hortumlu böcektir. Sonbaharda yumurtalarını armut tomurcuklarına bırakır ve yumurta halinde orada kışı geçirir. İlkbaharda yumurtadan çıkan larvalar meyve tomurcuklarını tamamen tahrip eder, bunun sonucunda onlardan tek bir çiçek bile gelişmez. Zarar görmüş meyve tomurcukları çiçeklenme döneminde gelişmez, kurur ve dökülür.

Mücadele

Mücadele, ergin böceklere yumurtalarını bırakmadan önce – Eylül sonundan Ekim başına kadar yöneliktir. 20 Eylül'den sonra ağaçları silkerek kontroller yapmak en iyisidir ve ağaç başına ortalama 5-8'den fazla böcek tespit edildiğinde, ilaçlamaya başlanmalı ve 5-6 gün içinde tamamlanmalıdır.

Zararlılara karşı düzenli mücadele yapılmayan armut bahçelerinde, armut tomurcuk hortumlu böceği genellikle çoğalır ve populasyon yoğunluğu sıklıkla ekonomik zarar eşiği olan ağaç başına 5-8 bireyi aşar; bu da, yumurta bırakmadan önce erginlere karşı Dursban 4E – %0.15 veya Vaztak New 100EC – %0.0125 vb. ile ilaçlama yapılmasını gerektirir. Bu zararlıya karşı mücadele, sadece sonbahar başında ergin formlara karşı etkilidir. Daha sonra, armut tomurcuk hortumlu böceğinin larvaları tomurcukların içinde gelişir ve zarar ilkbaharda, artık onlara karşı mücadelenin imkansız olduğu bir dönemde tespit edilir.