

Kasım ayı başlangıcı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2018 Брой: 11/2018



Geçen dönemde, agrometeorolojik koşullar, ekonomik anlamda yağış olmaksızın normalin üzerinde sıcaklıklarla karakterize edilen ılık hava tarafından belirlendi. Tarımsal ürünlerin gelişimi için sınırlayıcı faktör, devam eden atmosferik ve toprak kuraklığı oldu. Üst toprak katmanındaki yetersiz su içeriği, kaliteli toprak işlemeyi ve buğday ile arpanın agroteknik zaman dilimi içinde ekimini engelledi. NIMH agrometeoroloji ağının gözlem parsellerinden gelen bilgilere göre, sonbahar ürünlerinin fenolojik gelişimi, yüzey toprak katmanındaki mevcut su rezervlerine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Knezha, Sliven ve Ivaylo istasyonlarında ekim öncesi hazırlıklar tamamlandı, ancak ekime başlanmadı. Karnobat'ta ekim tamamlandı, ancak çimlenme kaydedilmedi. En yaygın gözlemlenen fenolojik evre, Nikolaevo, Razgrad, Tsarev Brod, Shabla, Yambol, Plovdiv ve Haskovo'da kaydedilen çimlenme

evresidir. Bazovets'te sürme başlangıcı, D. Chiflik ve Silistra'da ise kitlesel sürme bildirildi. Gelişim açısından en ileri durumda olanlar, Novachene, Pavlikeni ve Glavinitsa'daki erken ekilen sahalardır.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, hava durumu yine iklim normunun üzerinde sıcaklıklarla karakterize edilecek ve ekonomik anlamda yağış olasılığı düşük görünüyor. Bu dönemde de sonbahar ürünlerinin normal gelişimini sınırlayan faktör, yüzey toprak katmanındaki yetersiz nem olacak. Çimlenen sahaların sürme evresine girmesi bekleniyor.

Bu dönemde, yaprak oluşumu aşamasındaki buğday ve arpa sahalarında, tarla faresinin görülmesi açısından izleme yapılmalıdır. Zararlıya karşı kontrol önlemlerine, dekar başına iki aktif koloni bulunduğunda başlanmalıdır.

Koşullar, meyve bahçelerinde sonbahar bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için uygun olacaktır. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde (elma, armut), karaleke enfeksiyonlarını sınırlamak için %5'lik üre çözeltisi ile uygulama önerilir. Kitlesel yaprak dökümünden sonra, sert çekirdekli meyve türlerinde bakteriyel kanser, şeftali yaprak kıvrıcıklığı, yaprak deliği hastalığı ve erken kahverengi çürüklüğe karşı %2'lik Bordo bulamacı ile ilaçlama uygulanması gereklidir.

Kaynak: NIMH