


Kasım ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2018 Брой: 11/2018



Kasım ayının ilk on günlük döneminin çoğu gününde, agrometeorolojik koşullar kuru ve mevsime göre sıcak hava tarafından belirlenecek. On günlük dönemin sonunda öngörülen hafif yağışlar ekonomik bir önem taşımayacak ve üst toprak katmanının durumunda herhangi bir önemli değişikliğe yol açmayacaktır. Ekim ayı sonunda, tarla bölgelerinin büyük bir kısmında, 50 cm toprak katmanında yeterli nem bulunmuyordu ve Güneybatı Bulgaristan'daki bazı yerlerde (agrometeoroloji istasyonları Kyustendil, Sandanski) – 100 cm katmanda da durum aynıydı. Sonbaharın ilk yarısındaki kuraklık, ülkenin birçok bölgesinde mevsimlik toprak işleme operasyonlarının uygulanmasını engelledi ve bu nedenle, bazı tarla bölgelerinde kışlık kolza, buğday ve arpa ekimi için agroteknik son tarihler kaçırıldı. Kasım ortasına kadar, toprak nemi eksikliği ekilen sonbahar ürünlerinin gelişimi için sınırlayıcı bir faktör olmaya devam edecek. Tarla bölgelerindeki bazı yerlerde, üst toprak katmanındaki nem eksikliği, filizlenen ürünlerin bir kısmının hayatta kalmasını sorgulatacaktır.

Kasım ayının ikinci yarısında yağış öngörülmekte olup, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonunun ilk aşamalarının ilerlemesi için koşullarda bir iyileşme beklenmektedir. Bu dönemde, ürün gelişimi, ortalama günlük sıcaklıkların iklim normlarına yakın olduğu değerlerde gerçekleşecektir. Kasım sonunda, buğday ve arpanın baskın büyüme aşaması üçüncü yaprak aşaması olacaktır. Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde, agroteknik süre içinde ekilen kışlık tahıl ürünlerinin küçük bir oranı için (agrometeoroloji istasyonları: Băzovec, Novachene, Pavlikeni, Glavinitsa, Silistra), Ekim ayında çimlenip 1-2 yaprak oluşturanlarda, kardeşlenme aşaması gözlemlenecektir. Çimlenme aşaması, daha sonra ekilen Kasım ürünlerinde devam ediyor olacaktır. Kolzada yaprak oluşumu gözlemlenecektir. Sonbahar başında ekilen bitki örtüsünün küçük bir kısmı, Kasım sonuna kadar rozet aşamasının başlangıcına (5-6 yaprak) ulaşacaktır. Ay boyunca, öngörülen negatif minimum sıcaklıklar (eksi -7°C'ye kadar), çimlenme aşamasındaki kışlık tahıl ürünleri için kritik eşiklerin üzerindedir.

Kasım başında, meyve bahçelerinde sonbahar bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için koşullar uygun olacaktır. Yumuşak çekirdekli meyve türleri (elma, armut) için, kabuk lekesi enfeksiyonlarını sınırlamak amacıyla %5'lik üre çözeltisi önerilmektedir. Sert çekirdekli meyve türleri için, kitlesel yaprak dökümünden sonra, bakteriyel yanıklık, şeftali yaprak kıvrıcıklığı, delikli yaprak lekesi ve erken kahverengi çürüklüğe karşı %2'lik Bordo bulamacı çözeltisi ile ilaçlama yapılmalıdır.

Kasım ayında, meyve ağaçlarının dikimi için daha elverişli koşullar ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerde ortaya çıkacaktır. Ülkenin iklim koşullarında, ceviz hariç olmak üzere, meyve ürünlerinin sonbahar dikimi önerilmektedir.

Kaynak: NIMH