

'09/01 itibarıyla Tarımsal Ürünlerin Karantina Durumu Meyve Ürünleri'

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



Ağustos ayının ilk günlerinde, Batı Bulgaristan'daki tarımsal meteorolojik koşullar istikrarsız kalmaya devam etti. Bu durum, buğday hasadını daha da güçleştirdi ve tahıl kalitesini düşürdü. Ay sonuna kadar, Kjustendil, Pernik ve Sofya illerinin yüksek kesimlerinde buğday hasadı hala tamamlanmamıştı. Ağustos ortasında, atmosfer stabil hale geldi, sıcaklıklar arttı ve ülkenin farklı bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 33-38°C arasına ulaştı.

Ağustos ayının ikinci yarısında, bazı yazlık ürünler gelişimlerini tamamladı. Ayçiçeği hasadı ve kanola ekimi başladı. Güney Bulgaristan'da, mevsim boyunca daha az yağış alan bölgelerde, erkenci hibrit mısır hasadı da başladı.

MEYVE ÜRÜNLERİ

Fenolojik Evre: "meyve büyümesi" - "olgunlaşma"

Ağustos ayı boyunca, orta-erkenci elma çeşitleri - Primrouge ve Mollies Delicious, armut çeşitleri - Starkrimson, Williams, Clapp's Favorite ve erik çeşitleri - Green ve Althanova Renklode hasadına başlandı. Orta-geççi şeftali çeşitleri - Cresthaven, Glohaven, Hale ve işlenmeye yönelik çeşitler hasat edilmektedir. Ay boyunca, hastalık ve zararlılardan kaynaklanan hasarlar gözlemlendi; bunlara karşı bitki koruma önlemleri uygulanmakta olup, ilaçlamalar meyve hasat zamanı ve kullanılan bitki koruma ürünlerinin bekleme süreleri ile koordine edilmektedir.

Erik Kurdu

Erik kurdu, feromon tuzaklarında uçuşuna devam etmektedir, ancak yoğunluğu azalmaktadır. Zararlının ikinci nesil larvalarının zararlı faaliyeti de devam etmektedir. Ürün koruma yüzdesi iyidir. İzin verilen kurtlanma oranı %2-6 arasındadır. İkinci nesil erik kurdunun kontrolü için, 1 ila 4 kez olmak üzere toplam 39,36 bin dekar alan ilaçlanmıştır.

Eriophyid Akarları

Mevcut yetiştirme sezonunda, Kjustendil bölgesinde Aculus cinsine ait eriophyid akarlarının neden olduğu kitlesel zararlar gözlemlenmiştir. Zarar, ağırlıklı olarak meyve fidanlıklarında ve yeni kurulmuş erik bahçelerinde yapraklarda ve sürgünlerde tespit edilmiştir. Genç meyve bahçelerinde, zarar görmüş sürgünlerin oranı %20'ye kadar ulaşmıştır.

Erik Çekirdek Arısı

Son üç yıldır, Kuzeydoğu Bulgaristan'daki erik bahçelerinde, meyve şişme döneminde kitlesel meyve dökülmesi gözlemlenmektedir. Erken dökülen meyvelerin içinde, çekirdekler kırıldığında larvalara rastlanmaktadır. Etken, 2014 yılında Merkezi Bitki Karantina Laboratuvarı tarafından erik çekirdek arısı (*Eurytoma schreineri*) olarak tanımlanan yeni bir zararlıdır. Bu zararlının neden olduğu enfestasyon yüzdesi yıllar içinde artarak, bu yıl meyvelerin %90'ına kadar ulaşmıştır. Erik çekirdek arısının kontrolü için kesin zamanlamayı belirlemek amacıyla, zararlının gelişimi üzerinde düzenli gözlemler yapılması gerekmektedir.

Geç Kahverengi Çürüklük

Pernik, Loveç, Kjustendil, Sliven ve Targovişte illerinde erik meyvelerinde geç kahverengi çürüklüğün kitlesel görülmesi gözlemlenmiştir. Hastalık enfestasyonları zayıf ile orta şiddette saldırı arasında değişmektedir. Toplam 8,50 bin dekar alan ilaçlanmış olup, Loveç ve Sliven bölgelerinde ilaçlama Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmiştir.