

Toprak nemi eksikliği, ekilen sonbahar ürünlerinin vejetasyonu için hala sınırlayıcı bir faktör olmaya devam ediyor.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.11.2018 Брой: 11/2018



Kasım ayının ortalarında, tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklar tarafından belirlenecek. Tarımsal açıdan önemli yağışlar öngörülüyor ve toprak nemi eksikliği, ekilen sonbahar ürünlerinin vejetasyonu için sınırlayıcı bir faktör olmaya devam edecek. Bu nedenle, Kasım başında ekilen kışlık tahıl ürünlerinin çıkışı gecikecek ve bazı yerlerde Ekim sonunda çimlenen ürünlerin bir kısmının hayatta kalması sorgulanır hale gelecek. Nem eksikliği sonucunda, buğday, arpa ve kışlık kanola ile ekilen ürünlerin bir kısmı zayıf gelişmiş durumda. Dönem boyunca, kışlık tahıl ürünlerinde farklı gelişim evreleri gözlemlenecek: çıkış, ilk

yaprak oluşumu ve üçüncü yaprak evresi, özellikle Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde (Băzovec, Novachene, Pavlikeni, Glavinitsa) Ekim ayının ilk on gününde ekilen ürünlerde.

Nem eksikliği sonucunda, kışlık kanola gelişimi de geride kalıyor. Bu dönemde, 3-4 yaprak oluşturmuş kanola ekimleri baskın olacak. İstisnalar, güneydoğu bölgelerindeki belirli lokasyonlarda, Eylül ayında ekilen en erkenci ürünlerin bazılarında görülecek ve burada ayrıca rozet oluşumu evresinin başlangıcı da gözlemlenecek.

Kasım ayının ikinci on günlük döneminde, sonbahar ürünlerinde, özellikle tek ürün olarak yetiştirilenlerde, ekonomik açıdan en önemli zararlıları ve popülasyon yoğunluklarını belirlemek için izleme çalışmalarına devam edilmelidir: kanolada lahana gövdeli pire böceği istilası için; buğday ve arpada - tarla faresinin popülasyonu ve buğday yaprak böceği larvası ile tahıl sineklerinin neden olduğu zararlar için. Zararlı yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (EZE) aştığında, zamanında bitki koruma önlemleri alınması gerekmektedir.

Takip eden dönemde, geç sıra ürünlerinden (mısır, geçici baş lahana çeşitleri, yumru köklü bitkiler) alanların temizlenmesi için koşullar uygun olacaktır. İkinci on günlük dönem, meyve ağaçlarının dikimi için uygun bir zamandır.

Kaynak: NIMH