

Kasım ayı sonunda, agrometeorolojik koşullar artan dinamik ile karakterize edilecek.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.11.2018 Брой: 11/2018



Uzun süren sonbahar kuraklığının ardından, Kasım ayının ikinci on günlük döneminin sonu ve üçüncü on günlük döneminin başında gerçekleşen, ülkenin birçok bölgesinde 40-50 l/m²'yi aşan (Razgrad-57 l/m², Şumen-57 l/m², Rusçuk-60 l/m², Hasköy-50 l/m², Kırcaali-50 l/m², Çırpan-65 l/m², Eski Zağra-60 l/m², Sliven-59 l/m²) yağmur ve kar yağışları, sonbaharda ekilen ürünlerin üst toprak katmanlarındaki nem açığının giderilmesini sağladı. Bu yağışlar, nem eksikliği nedeniyle vejetasyonlarının ilk aşamasında bulunan ve başarılı bir şekilde kışı geçirmeleri şüpheli olan bir kısım kışlık tahıl ürünleri için çok geç kalmıştır.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar artan bir dinamizmle karakterize edilecektir. Dönemin başında ve sonunda, güney bölgeleri hariç olmak üzere, ülkenin çoğu yerinde tahmin edilen ortalama

günlük sıcaklık değerleri, buğday, arpa ve kışlık kanolanın vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumun altında kalacaktır. Kasım ayı sonunda, kar yağışı da beklenen Kuzey Bulgaristan'da, sonbaharda ekilen ürünler göreceli bir dinlenme durumuna girecektir.

Güney Bulgaristan'da ise, kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kanolanın vejetasyonu yavaş bir tempoda ilerleyecek ve ürünlerin fenolojik gelişiminde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Kasım ayı sonunda, buğday ve arpada şu büyüme aşamaları gözlemlenecektir: çıkış, üçüncü yaprak ve çoğunlukla Tuna Ovası'nın orta ve kuzeydoğu kesimlerindeki tarlalarda kardeşlenme başlangıcı.

Kanolada ise 4-5 yaprak aşaması baskın olacaktır. Sonbahar başında ekilen tarlaların küçük bir kısmı rozet oluşumu aşamasının (6. yaprak) başlangıcındadır.

Dönem içinde, meyve ağaçlarının sonbahar dikimini tamamlamak için daha uygun koşullar, Kasım ayının üçüncü on günlük döneminin ortasında oluşacaktır.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)