

'01.09 itibarıyla Tütün tarım ürünlerinin bitki sağlığı durumu'

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



Ağustos ayının ilk günlerinde, Batı Bulgaristan'daki tarımsal meteorolojik koşullar istikrarsız kalmaya devam etti. Bu durum buğday hasadını daha da geciktirdi ve tahıl kalitesini düşürdü. Ayın sonuna kadar, Köstendil, Pernik ve Sofya illerinin yüksek kesimlerinde buğday hasadı hala tamamlanamamıştı. Ağustos ortasında atmosferik koşullar stabilize oldu, sıcaklıklar arttı ve ülkenin farklı bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 33-38°C arasına ulaştı.

Ağustos ayının ikinci yarısında, bazı yazlık ürünler gelişimlerini tamamladı. Ayçiçeği hasadı ve kanola ekimi başladı. Güney Bulgaristan'da, mevsim boyunca daha az yağış alan bölgelerde, erkenci hibrit mısır hasadı da başladı.

TÜTÜN

Fenolojik Evre: "hasat sonu"

Ağustos ayı boyunca, tütünün fitosaniter durumu değişmedi. Sadece Blagoevgrad ve Kırcaali illerindeki bitkilerin %5-7'sinin üst yapraklarında tütün yaprakbiti kolonilerinin olduğu gözlemlendi. Kırcaali, Filibe ve Haskovo illerinde, viral hastalıklardan (tütün etch virüsü ve tütünde domates lekeli solgunluk virüsü) etkilenen %5 ila %7 oranında bitki kaydedildi. 117,8 bin dekar alan 1 ila 5 kez ilaçlandı.