

'09.01 Tarihi İtibarıyla Tarım Ürünlerinin Fitosaniter Durumu Ayçiçeği'

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



Ağustos ayının ilk günlerinde, Batı Bulgaristan'daki tarımsal meteorolojik koşullar istikrarsız kalmaya devam etti. Bu durum, buğday hasadını daha da geciktirdi ve tane kalitesini düşürdü. Ayın sonuna kadar, Köstendil, Pernik ve Sofya illerinin yüksek kesimlerinde buğday hasadı hala tamamlanmamıştı. Ağustos ortasında, atmosfer stabil hale geldi, sıcaklıklar arttı ve ülkenin farklı bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 33-38° C arasına ulaştı.

Ağustos ayının ikinci yarısında, bazı yazlık ürünler gelişimlerini tamamladı. Ayçiçeği hasadı ve kanola ekimi başladı. Güney Bulgaristan'da, mevsim boyunca daha az yağış alan bölgelerde, erkenci hibrit mısır hasadı da başladı.

AYÇİÇEĞİ

Fenolojik Evre: "olgunlaşma" – "hasat"

Ürünün fitosaniter durumu çok iyi. Ayçiçeğinin vejetasyon dönemi boyunca, ülkenin çoğu ilindeki toprak nem rezervleri optimal sınırlar içindeydi. Ağustos ayında, Vidin, Veliko Tırnovo ve Pernik illerinde **kahverengi yaprak lekesi (phomopsis)** görülme sıklığında artış kaydedildi – bitkilerin %7 ila %15'i etkilendi. Vidin, Pernik, Tırgovişte ve Şumnu bölgelerinde zayıf ile orta şiddette **alternaria** belirtileri görüldü. Ilıman sıcaklıklarla birlikte seyreden nemli hava, ayçiçeği tabla üzerinde **küf (botrytis)** gelişimini destekledi. Pernik ilinde tablalarında lekeler bulunan tekil bitkilere rastlandı. Silistra ilinde, 15 bin dekar alanda, görülme sıklığı bitkilerin %5.8'ine kadar ulaşmaktadır. Silistra ilinde, 15 bin dekar alanda, görülme sıklığı bitkilerin %5.8'ine kadar ulaşmaktadır. Ürünün hasadı başlamıştır.