

十一月农业气象预报

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.11.2019 Брой: 11/2019



漫长的秋季干旱延缓了冬季谷物和油菜作物的生长，并对部分已出苗植株的存活造成了疑问。在全国大部分地区，仲秋时节50厘米和100厘米土层的土壤含水量异常偏低。在保加利亚西北部部分地区、索非亚平原和上色雷斯低地（农业气象站：克内扎、巴佐韦茨、洛曾、普罗夫迪夫、帕扎尔吉克、斯利文），一米土层的土壤水分储量水平低于田间持水量的50%。

11月上半月，农业气象条件将由高于正常的气温决定。预报显示，在第一个十天期（上旬）的开始和结束时，大部分可耕地区的降水量将不足以弥补冬季谷物和油菜上层土壤的水分亏缺。

预报显示，11月下半月将有对农学意义重大的降水，且50厘米土层的土壤水分储量将大幅增加。在此期间的大部分日子里，可耕地区的冬季谷物和油菜作物将在日平均气温接近气候常态的情况下生长。

在第二个十天期（中旬）末，预计气温将大幅下降，在海拔较高的田地，不排除降雪可能，秋季作物的生长过程将减缓。

在11月的第三个十天期（下旬），大部分可耕地区的秋季作物生长速度将放缓，气温将接近小麦、大麦和冬油菜生长所需的生物学最低温度。秋季作物更活跃的生长过程条件将主要在该国南部和东南部地区形成。到11月底，小麦和大麦将普遍处于三叶期。在较晚播种的11月植株中，将观察到出苗期。在极南部和东部地区的部分冬季谷物作物中，那些在10月已形成2-3片叶子的，将进入分蘖期。对于油菜，由于秋季干旱，只有一小部分植株能在11月底前进入莲座形成期（5-6片叶子）的初始阶段。

预报本月最低气温在零下5-8°C之间，高于处于出苗期的延迟冬季谷物作物的临界水平。

11月种植果树和进行秋季植保喷雾的更适宜条件将出现在本月上半月。

在11月的前两周，应继续监测秋季作物，特别是连作作物，以确定某些害虫的种群密度：禾本科蝇类、普通田鼠、油菜叶蜂（伪幼虫）。若其数量超过经济损害水平，应及时进行处理。普通田鼠的经济损害水平为每狄卡尔（0.1公顷）2个活跃群落，油菜叶蜂幼虫（伪幼虫）的经济损害水平为每平方米2-3只。

来源：国家水文气象研究所