

六月末七月初桃树与杏树的植物保护

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



在桃树上，继续喷洒药剂以防治白粉病、穿孔病、褐腐病、桃潜蛾、梨小食心虫和蚜虫。

防治白粉病，使用以下一种杀菌剂：敌灭净 250 EC – 20 毫升/亩，恩布雷利亚 – 150 毫升/亩，印达 5 EW – 150 毫升/亩，卡拉马特 2.5 EW – 300 毫升/亩，科扎维特 DF – 150 克/亩，库姆鲁斯 DF – 750 克/亩，露娜经验 – 50 毫升/亩，米克洛菲尔 – 32-60 毫升/亩，密码 25 WG – 50 克/亩，仪式 – 32-60 毫升/亩，赛卡迪斯 – 15 毫升/亩，西格努姆 WG – 45 克/亩，赛斯散 20 EW – 15-36 毫升/亩，赛斯散生态区 EW – 65-200 毫升/亩，世高 250 EC – 20-30 毫升/亩，索尔福 80 WG – 750 克/亩，苏尔格兰 – 500 克/亩，硫磺 WG – 600 克/亩，硫磺喷射 80 WG – 600 克/亩，托帕兹 100 EC – 50 毫升/亩，弗洛苏尔 SC – 500 毫升/亩，丰特利斯 SC – 120 毫升/亩，赫利奥斯硫 C – 125-500 毫升/亩，海格力斯 120 SC – 15-25 毫升/亩。所列杀菌剂中，印达 5 EW – 150 毫升/亩，卡拉马特 2.5 EW – 300 毫升/亩，露娜经验 – 50 毫升/亩，密码 25 WG – 50 克/亩，西格努姆 – 45 克/

亩，赛斯散 20 EW – 15-36 毫升/亩，赛斯散生态区 EW – 65-200 毫升/亩，世高 250 EC – 20-30 毫升/亩，丰特利斯 SC – 120 毫升/亩对褐腐病也有效，可用于同时防治这两种病害。

防治梨小食心虫和桃潜蛾，使用以下一种杀虫剂： 艾万特 150 EC – 33.3 毫升/亩，肯定优选 – 200-225 克/亩，福亮塔戈 063 SC – 75 毫升/亩，德利盖特 250 WG – 30 克/亩，伊米丹 50 WG – 150 克/亩，康宽 20 SC – 16-30 毫升/亩，拉马德克斯额外 – 70 克/亩，流星 – 90 毫升/亩，速灭杀丁 5 EC – 0.02%。

蚜虫密度高时，喷洒以下药剂： 蚜虫密度高时，喷洒以下药剂：阿班托 – 60 毫升/亩，阿斯科特 WG – 40-80 克/亩，德卡 EC/德莎 EC/德纳 EC/波莱西/敌杀死 – 30-50 毫升/亩，敌杀死 100 EC – 8.75-12.25 毫升/亩，埃斯特雷拉 WG/拉姆莎 WG/阿达拉姆 WG/印杜拉姆 WG – 40-80 克/亩，卡利普索 480 SC – 20 毫升/亩，拉马德克斯额外 – 40-60 克/亩，亩旺特 100 SC – 0.075-0.1%，莫比朗 20 SG – 25 克/亩，自然破坏者 – 75 毫升/亩，普罗透斯 O-TEC – 0.05% - 0.06%，特福奇 – 14 克/亩。

在杏树上，喷洒药剂以防治褐腐病、杏疗病、穿孔病、桃潜蛾和梨小食心虫。*防治褐腐病，使用以下一种杀菌剂：* 德兰 700 WG – 0.05%，敌灭净 250 EC – 20 毫升/亩，恩布雷利亚 – 150 毫升/亩，印达 5 EW – 150 毫升/亩，卡拉马特 2.5 EW – 300 毫升/亩，露娜经验 – 50 毫升/亩，密码 25 WG – 50 克/亩，西格努姆 WG – 30 克/亩，赛斯散 20 EW – 12.5-30 毫升/亩，科霍斯 50 WG – 40-50 克/亩。所示杀菌剂中，德兰 700 WG – 0.05%、卡拉马特 2.5 EW – 300 毫升/亩和西格努姆 WG – 30 克/亩对杏疗病也有效。*防治桃潜蛾和梨小食心虫，使用桃树上所示的杀虫剂之一。*

为了使果树病虫害防治处理有效，必须及时且高质量地进行。此外，确定进行特定处理的必要性至关重要，这涉及通过具体监测来确定害虫密度，当超过经济危害阈值时，就应进行处理。