

十月和十一月期间定期检查作物是否有普通田鼠

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



十月和十一月期间，必须对秋季作物进行检查，当普通田鼠的种群密度超过经济损害阈值（每十公亩2个活跃群落）时，需采取防治措施。

普通田鼠（*Microtus azvalis*） – 广泛分布于全国。它对谷类作物、苜蓿、油菜、果园等造成损害。它群居于地下长长的隧道中，地表有数量不等的开口。可通过散落的土堆、形状完好的洞口以及塞入其中的绿色植物叶片来识别活跃群落。在温暖干燥的冬季，田鼠的繁殖能力非常强。它全年繁殖，单对田鼠的后代数量可达2400只。它以植物的绿色部分为食。从作物出苗到收获均可观察到损害。在严重侵扰的情况下，作物植株会变得稀疏。收获后，建议进行深耕，以破坏其群落并清除任何可能出现的、可作为田鼠食物的杂草植被。在田间检查时，需确定田鼠的种群密度，当每十公亩存在2个活跃群落时，应在洞口（活跃的洞口）投放毒饵，并用脚踩实以保护鸟类和有益动物。使用为此目的授权的灭鼠剂（磷化铝颗粒剂）进行处理——将毒饵放置在群落入口处。

