

# 加州盾蚧 - 桑白盾蚧

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 24.02.2021 Брой: 2/2021



## 危害:

该介壳虫吸食树干、枝条、嫩枝、果实和叶片的树液；

严重侵染时，树皮开裂并坏死，个别枝条干枯，随后整株树木死亡；

在嫩枝和果实上，受害部位会形成酒红色至紫色的斑点，叶片脱落，新梢变形，嫩枝树皮开裂，果实失去商品外观。

该害虫危害约200种植物——对苹果、梨、李、桃和杏造成严重损害。

它以初龄幼虫在嫩枝和树干的树皮上越冬，并在苹果花期完成其发育。

通过种植材料传播。

## 防治：

在休眠期，防治措施针对越冬阶段——幼虫；

在苹果和梨树芽膨大前，应使用植物保护油进行处理，其作用机制是窒息——形成一层油膜覆盖越冬幼虫的介壳，使其缺氧而死亡；

使用植物保护油处理时，也会消灭苹果全爪螨的越冬卵（当苹果树上每10厘米嫩枝有60-80个越冬卵、梨树上每10厘米嫩枝有40-50个越冬卵的确定密度时），同时对介壳虫、木虱、象甲等害虫也有防治作用；

该产品可添加到杀菌剂喷雾溶液中或单独使用。