

# 洋葱害虫控制系统

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



害虫 – 葱蝇 *Delia antiqua*

## 危害

孵化后的幼虫钻入叶片基部，在茎内蛀食形成隧道，并进入鳞茎。受害植株生长迟缓、变黄、倒伏，容易被拔出，最终干枯死亡。受害组织会发酵，并散发出难闻的洋葱腐烂气味。

## 防治

预计成虫始飞期在四月下旬。必须立即拔除并销毁受侵染的植株。首次施药应在成虫盛发期进行，此时正值酸樱桃开花期。经济损失阈值：每10次扫网捕获5头成虫。

## 害虫 – 烟蓟马 *Thrips tabaci*

### 危害

蓟马吸食叶片汁液，导致叶片出现白色斑点。严重受害时，斑点连片，整个叶片变白。在斑点处可观察到小黑点—即害虫的排泄物。

### 防治

四月，从烟蓟马最初出现时起就应予以关注，此时它们正从植物残体或杂草转移到洋葱上。

## 病害 – 霜霉病 *Peronospora destructor*

### 危害

叶片上出现褪绿至浅绿色的椭圆形病斑，潮湿天气下，病斑上覆盖一层紫色的孢子层。温度在3–25°C且植株上有水滴滞留时，有利于病害侵染。

### 防治

清除自生苗和初感染植株。发现首批病斑后，应进行生长期施药处理。在干燥天气期间，可减少施药频率。

处理洋葱作物时，应添加助剂！