

十月农业气象预报

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



十月，农业气象条件将较为多变，气温接近气候常态，降水则高于月均标准。

十月初，预计将出现高于季节常值的温度，这将为晚熟蔬菜作物形成额外产量创造条件，同时也有助于提高秋季果树品种和晚熟酿酒葡萄品种果实的糖分含量。

在气温偏高之后，预计在第一个十天期的后半段会出现短期降温和热量条件的正常化。

十月的第一个十天期预计将有显著降水，这将进一步阻碍季节性农事活动的开展。预计在第二个十天期的前半段以及第三个十天期的大部分时间里，进行播前土壤耕作和冬季作物播种的条件将更为有利。

夏季末和秋季初的干旱及随后出现的局部强降水，是导致冬油菜错过九月最佳播种期的原因。相当一部分计划播种面积将在十月、错过农艺适播期后完成播种。由于这些客观原因，晚播的油菜植株很可能无法在秋季营养生长期形成莲座丛（7-8片叶）——这是植株成功越冬所需的生长阶段。

十月是播种冬季谷类作物的最佳时期。第一个十天期是保加利亚北部播种小麦的农艺截止期，10月15日至25日是南部地区的播种期，而月底则是黑海沿岸地区的播种期。

考虑到土壤上层有良好的水分储备，本月已播种冬季作物的初期生长阶段将以中等速度进行。到十月底，小麦将根据播种日期先后，分别处于出苗期和三叶期。对于最早在九月底和十月初播种的田块，还将观察到分蘖期的开始。油菜将主要以叶片形成为主。

十月接近常值的预测温度条件，是导致普通田鼠——冬季作物的主要害虫之一——种群数量增加的一个前提。到月底前，必须检查越冬作物田块是否存在该害虫，如果其密度超过经济危害阈值（每德卡尔2个活跃鼠群），则需及时采取植物保护措施（在鼠群洞口放置毒饵）。

十月底，条件将允许在果园实施某些植保措施。受黑星病影响的苹果园和梨园，在采收后必须用5%的尿素溶液进行处理以降低感染源。对于核果类果树，在叶片大量脱落后，建议喷洒2%的波尔多液，以防治穿孔病、早期褐腐病和桃缩叶病的病原体。

来源：国家水文气象研究所