

三月农业气象预报

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



二月下半月的气候异常，出现了季节性的异常高温，许多低地地区的最高气温超过了21-22°C（克内扎 - 24°C，洛维奇 - 23°C，普列文 - 23°C，普罗夫迪夫 - 23°C，奇尔潘 - 23°C），这导致秋播作物的植被过程被激活，并使果树过早发育。

在三月上旬，仅在保加利亚南部的一些地方——普罗夫迪夫、帕扎尔吉克、桑丹斯基、克尔贾利和哈斯科沃，记录到了具有经济意义的20-30升/平方米的降水，这改善了秋播作物的土壤墒情储备。

在中部和东部地区，气温高于气候常态，也高于冬季谷类作物生长所需的生物学最低温度。

预计在三月中旬的大部分日子里，该国低地地区的气温将接近该时期的通常水平，同时冬季谷类作物的植被生长可能会延迟。

预计在三月下旬的前半段，气温将升高，秋播作物和多年生种植园的植被过程将激活。到三月底，小麦和大麦将主要处于分蘖阶段。

本月内，果树将经历不同阶段——从果芽膨大和萌发，到早花核果类树种（杏仁、杏、桃）的绿簇期、开花期和坐果期。

预计三月将出现零下5-10°C的最低气温——这对果树的花和幼果来说是临界值。

本月预计降水量接近或高于常态，这将增加100厘米土层的土壤墒情储备。由于二月降水量低于正常水平，在最南部和东南部地区的冬季谷类作物区，50厘米和100厘米土层的土壤墒情储备水平异常偏低，季节性地——在某些地方低于田间持水量的55%（斯利文、奇尔潘农业气象站）。

三月，预计多变的天气和频繁的降水将妨碍季节性农业技术活动的实施。在三月上旬的后半段，将出现更有利于进行果树花期前植保喷施的条件。本月内，土壤上层含水量的增加将限制计划播种早熟和中早熟春播作物区域进行播前整地的实施。因此，南部地区的向日葵播种有可能错过最佳播种期。

三月中旬（3月15-20日）是保加利亚南部开始向日葵播种的农技时期，而在三月下旬中期（3月25日—4月5日）——多瑙河平原地区开始播种。

关于全国不同地区何时具备进行植保活动的条件，请参见[此处](#)

来源：国家水文气象研究所