

六月农作物遭受冰雹灾害和真菌病原体高感染压力的可能性增加

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



六月的上旬，农业气象条件将由不稳定和季节性凉爽天气决定。该旬的预报降水将使50厘米和100厘米土层的土壤水分储量保持在较高水平——大部分农田区域将高于田间持水量的80-85%。六月初良好的土壤水分储量将对越冬谷类作物产生有利影响，在该国南部和东南部地区的作物中，将进行籽粒灌浆、籽粒形成和乳熟阶段。在籽粒灌浆至乳熟的跨阶段期间，小麦会受到麦蚜若虫的损害，这需要对作物进行田间检查，并在害虫密度超过经济损害阈值（2只若虫/平方米）时，及时进行处理。

在第二个十天的初期凉爽天气之后，预计气温将上升，农作物发育速度将加快。到六月中旬，大部分农田区域的大麦将达到蜡熟阶段。

在六月下半月的大部分日子里，农作物的发育将在接近气候常态的温度下进行。在第三个十天的初期，小麦将主要处于成熟阶段。

到月底，部分春季作物将进入生殖发育阶段：向日葵将开始开花，而早熟玉米杂交种将开始抽雄和雄穗开花。

六月份的气象条件将维持较高的真菌病原体侵染背景：蔬菜作物的霜霉病、晚熟樱桃品种的晚褐腐病、果树的疮痂病和白粉病。对于葡萄藤而言，从花序开花到豌豆大小坐果的跨阶段时期是霜霉病侵染的关键期。

本月内，进行植物保护喷施的更有利条件将出现在第二个十天的前半段以及第三个十天的大部分日子里。

六月，发生冰雹的概率仍将较高。冰雹过后，应在第一时间（最好在事件发生后48小时内）对受影响的果蔬作物使用含铜杀菌剂进行处理。

来源：国家水文气象研究所