

'秋季树莓种植时节'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 Брой: 11/2023



与其他水果树种相比，树莓具有一系列优势——花期较晚，不受春季霜冻影响，且每年都能结果。其果实美味、营养丰富，具有良好的药用特性。它们能增强心脏活动，为机体补充维生素和矿物质，并增进食欲。树莓以其解热功效而闻名，这归功于其中含有的水杨酸。

树莓种植地的选择需符合该作物对气候和土壤条件的要求。种植前的土壤准备工作包括深耕30-35厘米、浅耕以施入肥料以及中耕。需施用农家肥。

最适宜的种植期是从十月底到寒冷天气来临之前。春季种植也是可行的——直到三月底。行间距在1.8-2米之间。采用人工方式在深度约35厘米的犁沟中种植。

新种植园每德卡尔 (da) 施用8-10公斤氮肥，结果园则施用8-12公斤。在较粘重的土壤中，氮肥在早春一次性施用；如果土壤较轻，则在早春和五月底分两次施用。结果园的追肥在开花后进行。如果降雨不足，则根据需要灌溉至八月中旬。每年进行修剪，剪除已结果的两年生枝条，并疏除一年生枝条。种植后第二年，每株保留2-3根枝条用于结果，其余的低位剪除。第三年和第四年，结果枝数量增加，种植园进入盛果期。春季在芽膨大期进行修剪，去除受冬季霜冻、病害和害虫损伤的枝条。

夏季软果半灌木的养护

树莓会受到病害的侵害，如茎溃疡病、枝枯病、锈病、炭疽病，以及病毒病如花叶病和脉褪绿病。树莓最常见的害虫有树莓甲虫、蚜虫、吉丁虫、树莓瘦蚊、树莓瘦蝇。



在保加利亚，以下树莓品种分布最为广泛：

柳林——果实成熟期为8月27日至10月3日。果实大，深红色，有光泽，质地坚实，口感极佳，香气适中。植株生长势强，长势中等。该品种高产，且无需支撑结构即可栽培。

威拉米特——一个中等产量的美国品种。果实成熟期为7月6日至8日。果实中等大小，圆锥形，种子小。具有酸甜可口的风味和香气。植株长势中等，在灌溉条件下于较凉爽的地区栽培。

保加利亚红宝石——果实成熟期为6月28日至30日。果实中等大小，略呈圆锥形，红宝石色，不易散成单个小核果，具有宜人的酸甜口味和适中的香气。该品种高产。

肖普斯卡·阿莱娜——果实成熟期为7月3日至5日。果实中到大，钝圆锥形，鲜红色，光泽适中，种子小。易于采摘，酸甜口味极佳，香气适中。适合加工和冷冻。植株生长势强，有少量细刺。该品种高产。