

六月 – 从多变降水天气到超常高温天气

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



六月，农气条件将由不稳定的天气决定，降水量接近或高于月平均水平，这将使50厘米和100厘米土壤层的良好和非常好的水分储备保持在田间持水量（FC）的75-80%以上。在东北部和西南部地区（拉兹格勒、鲁塞、锡利斯特拉、桑丹斯基）的一些地方，土壤水分储备预计将较低，这些地区五月的降雨量低于月平均水平。

六月初，在高于正常的热力条件下，农作物将加速生长。由于小麦和大麦春季生长期的高温，它们将比往常更早完成发育。在六月上旬，田间大麦将普遍进入蜡熟期，旬末将达到完熟期。在此期间，小麦将经历乳熟期、乳熟向蜡熟过渡以及蜡熟期。

在第二旬的大部分时间里，农气条件将由接近同期常年的气温决定。在旬中期，高地冬粮作物将进入成熟期。玉米将形成叶片，向日葵将以花序形成为主。

在6月7日至13日的大部分时间里，农气条件将由温暖天气决定，并可能出现局地降水和冰雹。整个期间最高气温将超过30°C，在色雷斯平原将达到38°C，这是导致作物在营养生长和生殖生长阶段出现热应激和正常发育条件恶化的前提。

六月第二旬初，玉米将形成叶片；在最佳农时内播种的向日葵将形成花序；豆类作物（菜豆、大豆）将出现出芽和开花。田间大麦将以蜡熟期为主。小麦将普遍进入乳熟期和蜡熟期。油菜将进入成熟期。

预计六月第三旬高于正常的热力条件将加速春季作物的生长，其中一些作物将进入生殖发育阶段。在最佳农时内播种的向日葵作物将开始开花，而较早的玉米杂交种将出现抽雄和散粉。在此期间，最高气温预计将达到35-36°C，这将对蔬菜作物的开花和授粉产生负面影响。

六月，预计频繁的降雨是真菌病害发生的先决条件：果树上的晚期褐腐病、疮痂病和白粉病；蔬菜作物上的枯萎病；葡萄上的霜霉病、白粉病和灰霉病。月中下旬将创造更适合进行植物保护喷洒的条件。

！高温和低空气湿度将限制植物保护措施的实施，并使田间作业变得困难。

来源 *NIMH*