

七月——干燥炎热天气，这将导致农作物的生育间期缩短。

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.07.2024 Брой: 7/2024



本月上旬的前半段，农业气象条件将由不稳定天气决定。预报中全国多地农田区域的降水将暂时改善春季作物的植被生长进程条件。

在七月的中旬和下月的大部分日子里，预计天气相对干燥炎热，这将导致作物各生长阶段间的间隔期缩短。土壤水分亏缺将成为限制玉米和向日葵发育的因素。在玉米中，将观察到抽雄、雄穗开花和吐丝等不同阶段。本月末，早熟玉米杂交种将开始进入乳熟期。向日葵将经历开花、受精和籽粒灌浆过程。预计35-40°C的最高气温将对处于生殖生长阶段的作物产生负面影响。



预报中七月的高温及相对干燥的天气将限制农作物真菌病害的发展，但白粉病在多年生作物和蔬菜作物中除外。预计降水在月平均值附近或低于月平均值，这将需要实施加强的灌溉制度。



进行植物保护喷洒（针对果园中第二代食心虫、葡萄园中的黄葡萄蚜）的更适宜条件将出现在上旬的后半段、中旬的大部分日子以及月末。处理应在一天中较凉爽的时段进行。

在该国西部地区，出现局部强对流现象和冰雹、以及对农作物造成损害的可能性仍然较高——包括谷物作物倒伏和籽粒脱落、春季作物遭受机械损伤，以及蔬菜和水果生产受损。全国大部分农田区域的小麦收割将在火灾风险增加的情况下进行。

来源：国家水文气象研究所