

Capsicum
 Capsicum
 Capsicum 40
 Capsicum



РЕЗЮМЕ

Изследването *Capsicum annuum* L. е проведено от Pavel Popov, Hristov и Todorov. Изследването е насочено към изучаване на различните сортове чушки. Резултатите са представени в таблица [1]. Изследването е проведено в периода от 2018 до 2020 г. в с. „Бяла Чушка“ — община Шумен. Изследването е финансирано от Министерството на земеделието, горите и водите на Република България. Изследването е одобрено от Етичния комитет на Университет „Св. Кирил и Методи“ — Шумен.

Capsicum annuum L. е един от най-разпространените видове чушки. В България са известни много сортове, сред които 'Shipka Sladka', 'Dzhyulyunska Shipka 1021', 'Byala Shipka' и 'Ribki'. Изследването е насочено към изучаване на различните сортове чушки. Резултатите са представени в таблица [1]. Изследването е проведено в периода от 2018 до 2020 г. в с. „Бяла Чушка“ — община Шумен. Изследването е финансирано от Министерството на земеделието, горите и водите на Република България. Изследването е одобрено от Етичния комитет на Университет „Св. Кирил и Методи“ — Шумен.



Фигура 1. *C. annuum* сорт "Попов" (P. Popov) – растителна защита



Растителната защита на *C. annuum* var. *glabriusculum* се осъществява с помощта на фунгициди. Висока ефективност се постига при използване на фунгициди с концентрация 100–250 г/л в разтвор с концентрация 0.5–2.5%. При използване на фунгициди с концентрация 1.28% [3] се постига ефективност от 100%.



Растителна защита

Растителната защита на *C. annuum* var. *glabriusculum* се осъществява с помощта на фунгициди. Висока ефективност се постига при използване на фунгициди с концентрация 100–250 г/л в разтвор с концентрация 0.5–2.5%. При използване на фунгициди с концентрация 1.28% [3] се постига ефективност от 100%.



В България са отглеждани около 36 вида *C. cardenasi*, *C. chacoense*, *C. eximium*, *C. praetermisum*, *C. galapagoense*, *C. tovarii*, *C. ciliatum* [4]. Сред тях *C. chacoense* е найчесто срещаният вид. В България са отглеждани и други видове *Capsicum*, сред които *C. baccatum* [5].



☐ *C. pubescens*
☐ *C. eximium*
☐ *C. pereirae*
☐ *C. baccatum*



SHU *C. baccatum* 30,000 50,000 SHU
12,000 30,000 SHU *C. chinense* 220 200 SHU

Получено за печат 2008 г. 530 SHU. Прегледано и одобрено за печат 2008 г.

2006 г. - *C. ceratocalyx* M.Nee. Прегледано и одобрено за печат 2006 г. 7-9 SHU. Прегледано и одобрено за печат 2006 г. 30,000 SHU. Прегледано и одобрено за печат 2006 г. 12 [4]

Прегледано и одобрено за печат 2006 г. *Capsicum* [10]

Capsicum benoistii Hunz. ex Barboza,