

РЕЗЮМЕ

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София
Дата: 08.06.2026 Брой: 6/2026



РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

Възможностите за използване на препаратите са много широки — от борбата с вредителите до опрашването на растенията. За да се постигне максимален ефект, е важно да се следват инструкциите за употреба.

Оптималната температура за действие на препаратите е в диапазона 13°C до 18°C. При температури над 27°C и под 33°C ефективността им се намалява. При температури над 35°C препаратите могат да се разпадат.

При температури над 15°C и под 20°C препаратите действат по-бавно. При температури над 30°C и под 35°C ефективността им се намалява. При температури над 36°C и под 37°C препаратите могат да се разпадат.

Важно!

При температури над 6-8°C препаратите действат по-бавно.

При температури над 10-15°C препаратите действат по-бавно.

При температури над 15-20°C препаратите действат по-бавно.

Важно!

При температури над 15-20°C препаратите действат по-бавно.

При температури над 15-20°C препаратите действат по-бавно.

При температури над 2-2.5°C и под 1.5-2°C препаратите действат по-бавно. При температури над 45-50°C препаратите могат да се разпадат. При температури над 45-45°C препаратите могат да се разпадат.

Важно!

При температури над 15-20°C препаратите действат по-бавно.

 cherries

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

strawberries

Растителна защита на малини

Растителна защита на малини 8-10

Растителна защита

Растителна защита на малини

raspberries

Растителна защита на малини 5

Растителна защита

Растителна защита на малини 2-3

blackcurrant

Растителна защита на малини

Растителна защита

Растителна защита на малини

Растителна защита на малини

Растителна защита на малини

Растителна защита на малини T

Растителна защита

vineyard

Растителна защита на малини 8-10

Растителна защита

Растителна защита на малини

Глигол 36 SL, Фаст 36 SL, 500/1000 мл/л

20-30, 15-25, 40-60, 7-10

2-5, 12-15, 3-4

40%

1000-1500, 3-4, 5-10, 3-6