

# 在四月的菜园里

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



**本阶段农事操作：** 继续为早熟及中早熟露地生产进行幼苗管理。为四月下旬移栽早熟番茄、辣椒和茄子以及五月上旬移栽中早熟品种准备地块。播种晚熟番茄和中早熟结球甘蓝种子。实施必要的农艺措施，以确保保护地栽培设施内作物生长的最佳条件。在较高温度下，为改善空气相对湿度，需频繁湿润通道，并在玻璃温室中进行短时弥雾。若太阳辐射较强，需使用合适混合物对玻璃进行遮光（涂白）处理。

## 植物保护：

1. 若未进行消毒处理，需对番茄和甘蓝种子进行播前处理。必须遵守技术要求，以免破坏种子发芽率。
2. 苗床土壤混合物必须强制消毒。撒布饵剂防治蝼蛄。
3. 为防治幼苗猝倒病，需将病株及其邻近的健康植株移除，并在温室外部销毁，同时用杀菌剂溶液浇灌植株下方土壤。

4. 结合最后一次土壤耕作，当初步调查确认金针虫数量超过5头/平方米时，施用颗粒杀虫剂进行防治。此处理对地老虎、蝼蛄、大蚊幼虫、科罗拉多马铃薯甲虫、线虫也有效，并对刺吸式害虫（如蚜虫、叶蝉、蓟马）具有残留防治效果。
5. 移栽前一周，对幼苗喷洒杀菌剂。番茄上需注意观察早疫病（链格孢菌）、灰霉病（葡萄孢菌）、白粉病、叶霉病；黄瓜上需注意白粉病、霜霉病、角斑病（细菌性病害）。
6. 尽管保护地栽培设施内的害虫复合体相同，但由于较高的温度和较低的空气相对湿度，蓟马和红蜘蛛的危害活动加剧。
7. 露地早熟作物存在发生霜霉病的风险——危害十字花科蔬菜、洋葱及早熟马铃薯。应关注区域植保部门的预警信号，并及时采取防治措施。
8. 洋葱作物存在受葱蝇和潜叶蝇危害的风险，而甘蓝和萝卜则存在受甘蓝蝇危害的风险。

**注意事项：** 喷洒十字花科和洋葱作物时，必须在农药溶液中强制添加助剂。处理春季早期鲜食上市的香葱、大蒜、萝卜等作物时需格外谨慎，以避免农药残留造成意外且危险的毒害。