

病害消退，虫害进发

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.06.2016 Брой: 6/2016



为保护蔬果作物，需在六月下半月及七月持续进行虫害防治。

由于此期间空气和土壤温度较高，必须在清晨或傍晚进行喷洒作业。降水稀少，空气湿度不足加剧。果实正快速膨大，新梢生长已基本完成。高温导致果实出现称为"日灼"的损伤。

收集落果并将其移出果园至关重要，此举可降低害虫种群密度和病害感染水平。

干旱条件虽不利于作物细菌性和真菌性病害的发展与传播（其扩散较为有限），却为害虫繁殖创造了"有利"环境——包括果蛾、螨类、潜叶蛾、葡萄卷叶蛾、美国白蛾、蚜虫等。

蔬菜作物

本期主要病虫害

- 番茄晚疫病
- 番茄早疫病（链格孢属）
- 番茄白粉病
- 番茄白斑病
- 番茄细菌性斑点病
- 瓜类霜霉病
- 瓜类白粉病
- 蔬菜作物蚜虫
- 蛴螬

马铃薯

本期主要病虫害

- 马铃薯晚疫病
- 马铃薯早疫病（链格孢属）
- 科罗拉多马铃薯甲虫
- 蚜虫

果树作物

本期主要病虫害

- 苹果蠹蛾
- 李小食心虫
- 梨小食心虫
- 加州红圆蚧
- 美国白蛾
- 苹果红蜘蛛
- 旋纹潜叶蛾
- 梨木虱
- 果树蚜虫
- 苹果和梨黑星病
- 苹果白粉病
- 桃树白粉病

葡萄

本期主要病虫害

- 白粉病
- 霜霉病
- 灰霉病
- 葡萄黄蜘蛛
- 欧洲葡萄蛾