

# 瘦瘤白菜象鼻虫 (*Ceutorrhynchus pleurostigma*)

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 29.11.2016 Брой: 11/2016



*Ceutorrhynchus pleurostigma* 是一种小型甲虫，属于象鼻虫，体长约3毫米。其身体呈细长椭圆形，黑色，胸部区域覆盖有灰色绒毛和淡黄色鳞片。前胸背板有刻点并覆盖黄色绒毛。鞘翅上有纵向排列的灰色鳞片。体长为2.5—3毫米。卵呈椭圆形，白色，长0.35毫米。幼虫白色，弯曲，头部褐色，无足，长3—4.5毫米。蛹为离蛹，白色，长3.7毫米。

这是一种危害甘蓝根部的害虫。除甘蓝外，它也危害苜蓿、芜菁和萝卜。成虫和幼虫均会造成损害。成虫啃食叶片、花器、茎和根部，而幼虫则会在土壤表层以下的主根上诱导形成肿胀（虫瘿）。受侵染的甘蓝植株结球较小。

幼虫在虫瘿内（取食其内部组织5-6个月）和土壤中越冬。成虫于六月出现。这种形成虫瘿的甘蓝象鼻虫每年发生一代，并存在两个形态相似的生物型。一个生物型——春季型，以成虫越冬，并在野生十字花科植物上发育。另一个生物型——夏季型，主要以幼虫在受损的甘蓝茎秆内越冬，与栽培的十字花科植物相关。

## 防治

防治措施包括：收集并销毁受侵染的植株；秋季拔出甘蓝茎秆并将其与幼虫一同销毁；清除作物周围的杂草。在成虫大量发生时，可使用Agria 1050（150毫升/亩）和Nurelle Dursban（80毫升/亩）进行喷雾防治。