

"土豆甘露"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2017 Брой: 2/2017



引起番茄晚疫病的病原体（**真菌 *Phytophthora infestans***）会侵染番茄植株的所有地上部分。因此，应检查温室中是否出现病害症状。最初的病斑应首先在最底层叶片的边缘寻找。可观察到不规则至圆形的水浸状斑点，随后变为褐色。在高湿度条件下，斑点背面会出现一圈白色的产孢霉层。

病虫害防治策略

应定期对栽培设施进行通风。应避免打湿植株并在植株上残留水滴。在加温温室中，可通过提高温度来实现这一点。

在病害首次症状出现之前，应进行预防性处理。

已批准的植物保护产品

acrobat r - 0.25% (250 克/亩), acrobat plus wg - 200 克/亩, valbon - 180-200 克/亩, verita wg - 0.15%, vincer wg - 200 克/亩, equation pro - 0.04% (40 克/亩), carial star - 60 毫升/亩, consento sc - 200 毫升/亩, corset 60 wg - 20-30 克/亩, corset m df - 0.25%, quadris 25 sc - 0.075%, cupertin m - 400 克/亩, lieto - 40-45 克/亩, mancozeb 80 wp - 0.25%, manfil 75 wg - 210 克/亩, copper oxychloride 50 wp - 0.25 %, melody compact 49 wg - 185 克/亩, pencozeb 80 wp - 200 克/亩, pencozeb 75 wg - 210 克/亩, pergado copper 27 wg - 500 克/亩, polyram df - 0.2%, proxanil - 250 毫升/亩, revus 250 sc - 0.05% (50 克/亩), ridomil gold mc 68 wg - 0.25%, ridomil gold r wg - 500 克/亩, sankozeб 80 wp - 200 克/亩, sinstar - 70-80 毫升/亩, fortuna globe - 200 克/亩, funguran oh 50 wp - 0.15 %, champion wp/macc 50 wp/champ wp - 0.15%, captan 80 WG - 150-190 克/亩。