

'进行花前喷药的时间'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



三月下旬，日历上的春天开始。月平均气温升至4-8°C，云量减少，晴天增多。随着天气转暖，果树种类的强制休眠期结束，同时，其上的多种害虫活动开始活跃。三月的天气变化无常，这要求果农密切关注果园工作的适宜时机。

许多果树危险害虫的越冬形态在土壤中过冬，而落叶中则“潜伏”着准备侵袭的病原体。因此，经过翻耕和清理的果园是降低虫害风险的保障。如果至今尚未进行冬季喷药，则不应省略，因为它能消灭螨虫、蚜虫和介壳虫。

花前喷药于三月开始。第一次是在苹果的“鼠耳”期，使用杀菌剂防治白粉病和黑星病；第二次再次针对相同病害，但需加入杀虫剂以防治苹果锯蜂。对于梨树，需防治黑星病、梨锯蜂、梨木虱和椿象。对于甜樱桃和酸樱桃，需

防治褐腐病、穿孔病、火疫病和樱桃/酸樱桃象甲。李树需防治李锯蜂。杏树需防治褐腐病、穿孔病和桃枝蛀虫。桃树需防治缩叶病和桃枝蛀虫。

果树的花前喷药是一项重要的措施，不容忽视。它标志着化学防治的开始，而这个开端决定了整个生长季节果园的植物检疫状况。

[关于果园和菜园的化学防治——包括处理时机和适用产品，请阅读《植物保护》杂志2018年第2期。](#)