

# 多彩葡萄蛾（葡萄花翅小卷蛾）

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 16.05.2018 Брой: 5/2018



四月底至五月初，葡萄藤进入花序显现期。此阶段，最危险的害虫之一——欧洲葡萄卷叶蛾开始有害活动。其第一代幼虫会损害葡萄花序，当种群密度较高时（经济阈值 > 每100个花序6-8条幼虫），需要及时进行治疗处理。

六月，该害虫的第二代成虫开始飞行活动。它们将卵产在处于豌豆大小阶段的浆果上。幼虫通过啃食和取食浆果内部及种子来损害豌豆大小的浆果。受损的浆果会被稀疏的丝线缠绕。单条幼虫可损害7至24个浆果。

从八月到九月中旬，该害虫的第三代成虫继续飞行活动。幼虫损害正在成熟和已经成熟的葡萄浆果，并用丝线缠绕它们。这种损害为灰霉病病原体的侵入创造了条件。

**害虫防治策略：**

应在达到经济阈值时进行处理：对于鲜食葡萄品种，阈值为每100个豌豆大小浆果有6-7条幼虫；对于酿酒葡萄品种，阈值为每100个豌豆大小浆果有11-12条幼虫。

## 授权的植物保护产品：

Afikar 100 EC – 40 毫升/亩； Decis 100 EC - 12.5-17.5 毫升/亩； Dipel 2X - 0.1%； Efcy-metrin 10 EC / Cyper 10 EC - 40 毫升/亩； Karate Zeon 5 CS – 0.02%； Coragen 20 SC - 18 毫升/亩； Mageos - 10 克/亩； Rapax - 75-100 毫升/亩； Sumi Alpha 5 EC / Sumicidin 5 EC / Oasis 5 EC - 0.025%； Forey 48 B - 0.15%； Cyclon 10 EC - 40 毫升/亩； Cyperfor 100 EC - 40 毫升/亩； Citrin Max / Cyperkill 500 EC / Cypert 500 EC / Poli 500 EC - 6 毫升/亩； Sherpa 100 EW / Afikar 100 / Cyperfor 100 EW - 40 毫升/亩； Sherpa 100 EC - 40 毫升/亩； Delmur - 50 毫升/亩； Kedu - 40 毫升/亩；