

七月初，农业气象条件将发生积极变化

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2018 Брой: 7/2018



六月最后几天出现的广泛、大量降水，在保加利亚南部许多地区（帕扎尔吉克、普罗夫迪夫、斯利文、卡尔诺巴特）超过了50-60升/平方米，导致0-50厘米和0-100厘米土层的土壤水分储量增加。在大部分田间区域，土壤水分储量已达到田间持水量（FC）的80-85%以上。在一些南部地区，强降雨淹没了农田并造成了损害——成熟小麦作物倒伏。

预计在接下来一段时间，气温将上升，春季作物的生长条件将得到改善。在此期间，玉米将根据其早熟性，经历不同的生长阶段——叶片形成、抽雄、雄穗开花和吐丝。向日葵方面，在较高的田地里将进行花序形成，而田间区域的作物将进入开花阶段。菜豆和大豆将进入结荚期，棉花则将进入现蕾期。

在该时段的后半段，田间区域预计没有降水，这将为进行紧急的植物保护喷洒作业提供机会。六月末的潮湿天气为多种真菌病害的发展创造了条件：番茄晚疫病；黄瓜霜霉病；果树疮痂病和褐腐病，这将需要使用内吸性杀菌剂。

到七月初十天中期，该国许多地区上层土壤的高含水量将阻碍成熟谷物的收获。

来源：国家水文气象研究所